

Muntjac de Chine *Muntiacus reevesi*

Description

Synonymes : Muntjac, Muntjac de Reeves, Cerf aboyeur

Origine : Chine


Habitat en Belgique : Forêts denses à végétation basse, fourrés

Problématique : Lorsque sa densité de population est élevée, le Muntjac peut avoir une incidence sur les forêts, notamment sur la régénération et la flore, mais aussi sur les plantes de jardin et certaines cultures agricoles et horticoles. Il constitue aussi un risque pour les usagers de la route (collisions).

Statut : Selon le protocole ISEIA, le Muntjac de Chine est classé dans la catégorie A0 (pas encore établi).

Distribution : L'espèce n'est pas établie en Belgique, mais quelques cas de Muntjac tués lors d'une collision routière sont ponctuellement signalés en Campine.

Distribution actuelle en Belgique :
<http://observations.be/soort/maps/7700>




Caractéristiques

Le Muntjac est un petit Cervidé dont la hauteur au garrot atteint 50 cm. Son pelage est de couleur brun-roux la plupart de l'année, et vire au gris terne en hiver. Son ventre est généralement jaunâtre. La face interne des cuisses et le menton sont tachés de blanc. La queue est grande et plate, brune au-dessus et blanche en dessous.

Le Muntjac a une apparence voutée, vu que la croupe est plus élevée que les épaules. Les deux sexes portent des marques bien visibles sur la gueule. Les mâles ont des bois courts et des défenses. Les bois sont recourbés en arrière et se terminent par une pointe incurvée chez les sujets âgés.

Par son aspect extérieur, le Muntjac ressemble à un chien. Son cri consiste en un aboiement unique très sonore qu'il répète en marquant de courtes pauses, ces intervalles s'allongeant souvent en période de rut (qui peut avoir lieu tout au long de l'année).

Les bois des mâles sont couverts de fourrure à la base. Ils sont droits, courts et ne présentent pas (ou peu) d'embranchements.



Le Muntjac relève la queue dans les situations d'alerte.

Pelage d'été

Pelage d'hiver

La fourrure peut être brun grisâtre, les pattes antérieures presque noires.

Identification au long de l'année


- Pelage d'été : fourrure brun-roux abondante sur l'échine et brun-jaune sur le ventre.
- Pelage d'hiver : brun plus gris, pattes antérieures presque noires sur le devant, principalement chez le mâle.
- Les bois se forment en mai et poussent pendant l'été et jusqu'à l'automne.

Indices de présence et distribution

Les empreintes sont plus petites que celles d'autres cervidés (moins de 3 cm de long contre 3 à 4,5 cm pour le chevreuil), mais on peut les confondre avec celles de juvéniles d'autres espèces.


Les excréments sont noirs, luisants et rayés. Ils peuvent être sphériques à cylindriques, mais sont habituellement effilés à une extrémité.

En cas de conflit territorial, les mâles grattent le sol avec leurs pattes antérieures, ce qui met le sol à nu. Les éraflures provoquées par le Muntjac sur l'écorce des arbres quand il frotte ses bois peuvent être confondues avec celles des chevreuils, mais elles se situent généralement à une hauteur moindre (10-40 cm au-dessus du sol).




Les pinces du sabot de Muntjac sont généralement asymétriques (pince interne plus petite que l'externe)

Espèces semblables (indigènes / exotiques)



Les Muntjacs peuvent être confondus avec des bergers allemands, surtout de loin ou dans les sous-bois, en raison de leur taille identique et de la marque foncée qu'ils portent sur la tête.



Informations complémentaires:

- www.observations.be/soort/info/7700
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_muntjak
- <http://ias.biodiversity.be/species/show/125>