

# Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*

## Description

**Origine :** De l'ouest de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord

**Habitat en Belgique :** Nidifie dans les étangs et mares avec une végétation développée au niveau des berges. En hiver, fréquente aussi des plans d'eau ouverts plus étendus, en compagnie de canards plongeurs.

**Problématique :** L'Erismature rousse a atteint l'Espagne et elle représente une menace pour la population sauvage d'Erismatures à tête blanche (*O. leucocephala*). L'Erismature à tête blanche a disparu de nombreux pays européens au début du siècle, notamment à cause de la raréfaction de son habitat (zones humides). L'Erismature rousse, qui est dominante, s'hybride avec sa cousine et la menace ainsi par pollution génétique. L'Erismature rousse est soumise à un plan d'action européen : tout pays dans lequel elle est détectée est tenu de l'éliminer, en faveur de la sauvegarde de l'Erismature à tête blanche.

**Statut :** Selon le protocole ISEIA, l'Erismature rousse est dans la catégorie B0 (distribution restreinte et impact modéré chez nous).

**Distribution :** En 1950, quelques exemplaires se sont échappés au sud-ouest de Grande-Bretagne et l'espèce s'est rapidement dispersée. Plus tard, on l'a observée en nombre croissant chez nous. Les effectifs les plus nombreux se rencontrent dans la région du port d'Anvers. De multiples observations ont aussi été signalées dans le bassin malinois et celui de la Nèthe. Actuellement, elle niche en divers endroits. Des mesures ont déjà été prises sur le principal foyer de multiplication pour limiter la population nicheuse.

**Distribution actuelle en Belgique :** <http://observations.be/soort/maps/171>




## Caractéristiques

Canard au corps rond, trapu, étonnamment petit, aux ailes particulièrement courtes. Longue queue, généralement dressée. Tête proportionnellement pleine et large, à grand bec aplati simulant un sourire.

Mâle en livrée estivale brun roux, à joues blanches et calotte noire. Bec bleu clair vif. En hiver, plumage brun beaucoup plus terne contrastant avec les joues blanc uni.

La femelle ressemble plus ou moins au plumage hivernal du mâle, mais est davantage striée, la calotte étant plus brune, les joues de couleur plus crème, barrées par une bande brunâtre parallèle à la calotte. Bec gris foncé.



## Espèces semblables

Certaines espèces à joues blanches peuvent prêter à confusion.

En raison de son petit format, l'Érismature rousse peut faire penser à un Grèbe lorsqu'il tient sa queue sous l'eau.

En période de plongées intensives, l'Érismature rousse et les autres espèces citées peuvent être introuvables pendant de longs moments ou observées furtivement, ce qui complique leur identification.

**Harle piette**  
Hivernant  
(*Mergellus albellus*)


Calotte brun  
châtain

Femelle

Petit bec gris

Joues et gorges  
blanches, d'éten-  
dues limitées

38 à 44 cm



**Grèbe esclavon**  
Hivernant rare  
(*Podiceps auritus*)

Calotte foncée,  
œil rouge et  
joues blanches


Bec court, droit  
et pointu

Col plus fin

Queue non  
visible

46 à 55 cm

Plumage plus gris



**Macreuse noire**  
Hivernant (surtout au littoral)  
(*Melanitta nigra*)

Calotte foncée, visage  
pâle variable


Femelle

Rarissime à  
l'intérieur des  
terres. Plus  
élancé que  
l'érisature  
rousse

Bec triangulaire  
foncé, tuberculé  
à la base

44 à 54 cm

Calotte brune



### Références et infos complémentaires :

- Mullarney, K, Svensson, L, Zetterstrom, D & Grant, P J (2010) 'ANWB Vogelgids van Europa'. ANWB Media
- Snow, DW and Perrins, CM (1998) "The Birds of the Western Palearctic". Oxford University Press