

# Corbeau familier *Corvus splendens*

## Description

**Synonymes :** –

**Origine :** Sous-continent indien

**Habitat :** Dans les régions qu'il a colonisées, aux Pays-Bas par exemple, il niche dans les villes ou leur périphérie, souvent à proximité de ports.

**Problématique :** Dans les régions occupées, le corbeau familier est considéré comme un nuisible. Prédateur généraliste, il se nourrit de restes d'aliments humains, de charognes, de céréales, de petits passereaux ou de poussins et d'invertébrés. Dans son aire naturelle de répartition, il est également catalogué comme nuisible pour l'agriculture, car il détruit les récoltes de fruits, de blé, de raisins et de maïs. De plus, il concurrence diverses espèces indigènes.

**Statut :** Le corbeau familier n'a pas encore été rangé dans l'une des catégories du protocole ISEIA.

**Distribution :** Le corbeau familier a atteint une grande partie de son aire de répartition actuelle (Sud-Est asiatique, Afrique orientale, Moyen-Orient) par bateau (« passager clandestin »). Sa présence en Belgique n'a pas encore été constatée avec certitude. Il faut s'attendre à ce que, tôt ou tard, la population de Hoek van Holland (Pays-Bas) pénètre en Belgique. Elle conquiert de nouveaux territoires en passant par les villes portuaires. Zeebrugge et Anvers semblent par conséquent des sites logiques d'implantation.



**Distribution actuelle en Belgique :** <http://observations.be/soort/maps/261>

## Caractéristiques et comportement

Corvidé de taille moyenne, mais surtout élancé, à pattes assez longues et longue queue. Haut sur pattes.


Long et parallèle, le bec a l'air grand par rapport à une tête plutôt petite. De teinte variable, mais souvent très gris pâle, la nuque et la poitrine contrastent avec la livrée sombre du sommet du crâne et de la gorge.

Le mâle et la femelle ont un aspect identique.

Espèce très sociable

- Avantage : elle met beaucoup de temps à se reprendre et à coloniser de nouveaux territoires.

- Inconvénient : descendants et ascendants restent longtemps en groupe, ce qui joue en faveur de leur réussite. Cela leur permet de profiter de leurs expériences respectives concernant les menaces par exemple (cf. Perruche à collier).





# Prudence de mise lors de l'identification

Sur quelques points, le corbeau familier présente une grande similitude avec la corneille noire.

- Son cri (un 'kwa-kwa-kwa' rauque ou variante) rappelle celui de la corneille noire, donc prudence.
- Le nid est un assemblage grossier de branches et de matériaux naturels et artificiels, perché dans des arbres ou sur des supports élevés artificiels tels que des grues. Toujours au voisinage de l'homme.
- Trois à cinq œufs par couvée, de forme et de couleur variables. Les saisons de ponte et de couvaison coïncident avec celles de la corneille noire.

## Espèces semblables

Attention ! Diffère peu de nos espèces indigènes.



### Références et infos complémentaires :

- <http://waarneming.nl/soort/info/261>
- Lever, C (2005) "Naturalised Birds of the World". T & A D Poyser
- Madge, S and Burn, H (1999) "Crows and Jays: A Guide to the Crows, Jays and Magpies of the World". Christopher Helm, London
- Mullarney, K, Svensson, L, Zetterstrom, D & Grant, P J (2010) 'ANWB Vogelgids van Europa'. ANWB Media
- Snow, DW and Perrins, CM (1998) "The Birds of the Western Palearctic." Oxford University Press